

EL PODER del INICIO

La vacunación temprana contra el meningococo transforma el mañana

Para lograr una protección amplia de la **enfermedad meningocócica invasiva** se requieren **2 vacunas** contra los **5 serogrupos** más frecuentes del meningococo ^{1,2}

BEXSERO
Vacuna meningocócica multicomponente del grupo B
(Recombinante, adsorbida)



MENVEO
Vacuna Conjugada Contra Meningococo de los Serogrupos A, C, W135 e Y



Estas vacunas se pueden coadministrar a partir de los **2 meses**.^{3,4}





BEXSERO

Vacuna meningocócica multicomponente del grupo B
(Recombinante, adsorbida)

Bexsero MIPRES
Principio Activo DCI: 50179
Concentración: 6646

Esquema de Bexsero³

Edad de Inicio	Esquema	Inmunización primaria	Intervalo	Refuerzo
2 a 5 meses [†]	2 + 1	2 dosis	≥ 2 meses	1 dosis, entre los 12 y 23 meses de edad, con un intervalo de al menos 6 meses después de la segunda dosis y la dosis de refuerzo.
6 a 11 meses				1 dosis entre los 12 y 23 meses de edad, con un intervalo de al menos 2 meses después de la segunda dosis.
12 a 23 meses				1 dosis 12 a 23 meses después de la segunda dosis.
Niños ≥ 2 años, adolescentes y adultos [§]	2	2 dosis	≥ 1 mes	En grupos de riesgo, de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

Administración, uso y manejo³



BEXSERO se administra por vía intramuscular profunda. En lactantes se recomienda la región anterolateral del muslo; en niños mayores, adolescentes y adultos, el músculo deltoides (parte superior del brazo).



Se deben usar sitios de inyección separados si se administra más de una vacuna al mismo tiempo.



Tras el almacenamiento de la suspensión, se puede formar un depósito fino de color blanquecino.



Agite bien la vacuna antes de usarla para formar una suspensión homogénea.



[†] En lactantes de 2 a 5 meses de edad, Bexsero se puede también administrar con un esquema de vacunación 3+1 (3 dosis de inmunización primaria separadas por al menos 1 mes, más, 1 dosis de refuerzo entre los 12–23 meses de edad con un intervalo de al menos 6 meses después de la tercera dosis).

[§] La seguridad y eficacia de BEXSERO en individuos mayores de 50 años de edad no ha sido establecida.



Esquema de Menveo⁴

Edad de Inicio	Número de dosis	Esquema
2 a 6 meses[†]	3	2 ^{da} dosis a los 2 meses de la 1 ^{ra} . 3 ^{ra} dosis tan pronto como sea posible durante el segundo año de vida.
7 a 23 meses	2	2 ^{da} dosis, con intervalo mínimo de 2 meses. La 2 ^{da} dosis se administrará durante el segundo año de vida.
Niños ≥ 2 años, adolescentes y adultos^{‡§}	1	Dosis única

La necesidad de dosis de refuerzo debe definirse de acuerdo a las recomendaciones nacionales.

[†]En lactantes de 2 a 6 meses de edad, Menveo se puede también administrar con un esquema de vacunación de 4 dosis.

[‡]Para niños entre 2 y 5 años de edad con elevado riesgo continuo de enfermedad meningocócica se puede administrar una segunda dosis 2 meses después de la primera dosis.

[§] No existen datos para individuos mayores de 65 años de edad. Existen datos limitados en individuos de edades entre 56-65 años.

Administración⁴



MENVEO se aplica mediante inyección intramuscular, preferentemente en:

- La región anterolateral del muslo en lactantes.
- En la región superior del brazo en el músculo deltoides en pacientes mayores.




Deben utilizarse sitios de inyección separados si se administra más de una vacuna en el mismo lugar.



La vacuna no debe inyectarse por vía intravenosa, subcutánea o intradérmica, y no debe mezclarse con otras vacunas en la misma jeringa.





Esquema de vacunación

Edad de aplicación en meses (m)

Esquema \ Edad	2 - 3m	4 - 5m	7 - 8m	9 - 10m	12 - 14m	15 - 17m	>24m	≥25m
Esquema # 1 (2 a 6 meses) [†]	Bexsero Menveo	Bexsero* Menveo*			Bexsero [#] Menveo			
Esquema # 2 (6 a 11 meses)			Bexsero Menveo	Bexsero*	Bexsero** Menveo [‡]			
Esquema # 3 (12 a 23 meses)					Bexsero Menveo	Bexsero* Menveo*	Bexsero***	
Esquema # 4 (≥ 2 años) Niños, adolescentes y adultos							Bexsero Menveo	Bexsero [§]

Coadministración

Bexsero es una vacuna que cuenta con múltiples opciones de esquemas desde los 2 meses de vida, con posibilidad de **coadministración en cada una de ellas** con cualquiera de los siguientes antígenos de vacunas, ya sea monovalentes o combinados.³

[†] En lactantes de 2 a 5 meses, **Bexsero** también se puede administrar en un esquema 3 + 1 (3 dosis de inmunización primaria, separadas cada una por un intervalo no menor a 1 mes + 1 refuerzo en el segundo año de vida). En lactantes que inician la vacunación entre los 2 y los 6 meses de edad, **Menveo**, también se puede administrar en esquema de 4 dosis.

*Intervalo entre las dosis ≥ a 2 meses.

[#]El refuerzo tan pronto como sea posible durante el segundo año de vida. El intervalo entre la segunda dosis de **Bexsero** y el refuerzo debe ser ≥ a 6 meses.

**Refuerzo en el segundo año de vida, con un intervalo > 2 meses después de la inmunización primaria.

[‡]2da dosis tan pronto como sea posible durante el segundo año de vida.

***Intervalo de 12 a 23 meses después de la segunda dosis.

[§]La segunda dosis debe tener un intervalo de ≥ 1 mes. El refuerzo se debe considerar adicional a las dos dosis de primovacunación en individuos con riesgo continuo de exposición a la enfermedad meningocócica.

Indicación Bexsero³ | Registro Sanitario INVIMA 2024MBT-0000098

Bexsero está indicado para la inmunización activa de individuos a partir de 2 meses de edad frente a la enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis grupo B. El uso de esta vacuna debe seguir las recomendaciones oficiales.

Información de seguridad de Bexsero:³

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.

Reacciones adversas

Lactantes y niños (hasta 10 años)

Muy frecuentes ($\geq 1/10$): trastornos de alimentación, somnolencia, llanto inusual, cefalea, diarrea, vómitos (poco frecuentes después de la dosis de refuerzo), erupción cutánea (niños de 12 a 23 meses) (poco frecuentes después de la dosis de refuerzo), artralgia, fiebre ($\geq 38^\circ\text{C}$), dolor a la presión en el lugar de la inyección (incluyendo dolor intenso en el lugar de la inyección definido como llanto cuando se mueve la extremidad en la que se administró la inyección), eritema, hinchazón o induración en el lugar de la inyección, irritabilidad.

Adolescentes (a partir de 11 años) y adultos

Muy frecuentes ($\geq 1/10$): cefalea, náuseas, mialgia, artralgia, dolor en el lugar de la inyección (incluido dolor intenso en el lugar de la inyección definido como incapacidad para realizar la actividad diaria normal), hinchazón, induración o eritema en el lugar de la inyección, malestar.

Indicación Menveo⁴ | Registro Sanitario INVIMA 2017M-0011552-R1

Menveo está indicado en la inmunización activa de niños (desde los 2 meses de edad), adolescentes y adultos, para prevenir la enfermedad meningocócica invasiva causada por los grupos A, C, W-135 e Y de la Neisseria meningitidis. El uso de esta vacuna debe realizarse conforme con las recomendaciones oficiales.

Información de seguridad de Menveo⁴

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a cualquier excipiente, incluyendo el toxoide diftérico (CRM197).

Reacciones adversas

Niños de 2 a 23 meses de edad:

Muy frecuentes $> 1/10$: desorden alimenticio, llanto persistente, somnolencia, diarrea, vómitos, irritabilidad, sensibilidad en el sitio de inyección, eritema en el sitio de inyección ($< 50\text{ mm}$), induración en el sitio de inyección ($< 50\text{ mm}$).

Niños de 2 a 10 años de edad:

Muy frecuentes $> 1/10$: somnolencia, dolor de cabeza, irritabilidad, malestar, dolor en el sitio de inyección, eritema en el sitio de inyección ($< 50\text{ mm}$), induración en el sitio de inyección ($< 50\text{ mm}$).

Adolescentes y adultos de 11 a 65 años de edad:

Muy frecuentes $> 1/10$: dolor de cabeza, náuseas, dolor en el sitio de inyección, eritema en el sitio de inyección ($< 50\text{ mm}$), induración en el sitio de inyección ($< 50\text{ mm}$), malestar.

Referencias: Referencias:

1. Macías Parra M, Gentile A, Vazquez Narvaez JA, et al. Vaccine. 2018;36(50):7609-7617. 2. Mbaeyi S; Public Health Foundation; 2024; 207-224. 3. Información para prescribir Bexsero aprobada en Colombia. 4. Información para prescribir Menveo aprobada en Colombia.

Material exclusivo para médicos | Información para prescribir disponible a solicitud | Referencia(s) disponible(s) a solicitud | Todo evento adverso sobre un producto de GSK debe ser notificado a GSK al teléfono 018005184773 o escribir al correo programa.dirmedica@gsk.com | GSK Colombia S.A. Av. Cll 116 # 7 – 15 Interior 2, Oficina 601A | Bogotá, Colombia | Solicite mayor información científica de nuestros productos en nuestro servicio de información médica, a través del email mila@gsk.com | PM-CO-BEX-BROC-260001 | Fecha de elaboración: mayo 2026 | Copyright © GSK 2026. Todos los derechos reservados | Marcas propiedad de o licenciadas por GSK | Mayor información sobre seguridad del producto se encuentra disponible en la Información para Prescribir (IP).

Información para
prescribir Bexsero



Información para
prescribir Menveo



Esta información está dirigida exclusivamente
a profesionales médicos habilitados para prescribir.